

കുട്ടിക്കാലത്തെ സാധാരണ അസുവണ്ണൾ

വയറിളക്കം

- മലത്തിൽ സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞയളവിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വയറിളക്കം ഉണ്ടാകുന്നത്.
- അത് കുട്ടികളിൽ സാധാരണമാണ്, വിശ്വേഷിച്ചും 6 മാസത്തിനും 2 വയസ്സിനുമിടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ.
- പദ്ധവിൽ പാൽ അല്ലെങ്കിൽ ശിശുക്ക്ഷണ ഫോർമ്മേച്ചർ കുട്ടിക്കുന്ന 6 മാസത്തിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള ശിശുക്കളിലും അത് വളരെ സാധാരണമാണ്.
- അതിസാരം ബാധിച്ച ഒരു ശിശുവിനെ താഴെപ്പറയുന്ന 3 വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പെടുത്താൻ കഴിയും: ജലാംരുചുള്ള അകൃട് വയറിളക്കം, (2) വയറുകടി (രക്തംകലർന്ന വയറിളക്കം) (3) നിരന്തര വയറിളക്കം (14 ദിവസത്തിലധികം റീംഡിക്കുന്ന വയറിളക്കം). വയറിളക്കമുള്ള എല്ലാ ശിശുകളുടെയും കാവൽത്തിൽ ഈ നിർണ്ണയം നടത്തണം: (എ) ജലാംരുചുള്ള അകൃടിക്കുന്നതിനും നിരന്തര വയറിളക്കത്തിനും ലക്ഷണങ്ങൾ; (ബി) വയറിളക്കത്തിനെന്ന് ദൈർഘ്യം; കുടാതെ (സി) മലത്തിൽ രക്തം.
- വയറിളക്കമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ജലാംരുചുള്ളേണ്ട ഏന്നു നിർണ്ണയിക്കണം - കുട്ടിക്ക് താഴെ ക്രൂരുകൾ, മാസ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വന്ന ചേതനാനില, മുത്രമൊഴിക്കാതിരിക്കുക, ചർമ്മത്തിൽ കുത്തിയാൽ തുക്ക് സാവധാനത്തിലോ വളരെ സാവധാനത്തിലോ പഴയ നിലയിലാകുക എന്നിവ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.



എന്താണ് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ടത്

- കുട്ടിയുടെ പ്രായം 6 മാസത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ, മുലയുടുന്നത് തുടരുകും, ഓ.ആർ.എസ്. നോഫം റീംഡിപ്പേരേതേക്ക് തുടരുന്നതാണ് അഭികാഖ്യം.
- കുട്ടിയുടെ പ്രായം 6 മാസത്തിലധികാം - ലൈംഗിക ഗണകിൽ; മുലപാലിനു പുറും, ഓ.ആർ.എസ്. ഉം സുപ്പ്/കൺടിവെള്ളം, ഇളംിർ, നാരങ്ങാ വെള്ളം തുടങ്ങിയവ പോലെയുള്ള മറ്റ് ഭ്രാവകങ്ങളും നൽകണം.



ബാർഖിക്കുക

- നല്ല ശുചിത്വം പാലിക്കുക വഴി കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയും.
- ശുദ്ധജലം കുട്ടിക്കുക; തിളപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അരിച്ച്.
- വെള്ളം മുടിവിയ്ക്കുക.
- ഒരു കുഴിഞ്ഞ തവി ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളമെടുക്കുക; വെള്ളം സുക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വിരലുകൾ മുകരുത്.
- ശൈചാലയം ഉപയോഗിച്ചതിനു ശ്രേഷ്ഠവും ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിനും കഴിക്കുന്നതിനും മുൻപും നിംബുഡ കൈകൾ കഴുകുക.
- പഴകിയതോ വളിച്ചതോ ആയ ആഹാരം കഴിക്കരുത്.
- കലഞ്ഞും ചട്ടികളും കഴുകിയതിനു ശ്രേഷ്ഠം അവ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടാണ് അനുവദിക്കുക.
- എന്തെങ്കിലും അസുവിത്തിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മരുന്നു കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് നിംബുഡ യോക്കുടുട അഭിപ്രായം തേടുക. സുയം മരുന്നുകൾ നൽകരുത്.
- എന്തെങ്കിലും അപകട സുചനകൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുക.
- കുട്ടിയെ പുർണ്ണമായും രോഗമുക്കത്താക്കുക.
- അഴുകുവെവള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രോംതല്ലുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് കൊതുക് പെറ്റുപെരുരുന്നത് തടയും.
- ഉണ്ണേബോൾ കൊതുകുവല/ മരുന്നുപുരുട്ടിയ കിടക്ക വല ഉപയോഗിക്കുക.

- കുടുതൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, വാഴപ്പഴം, ബിച്ചുഡി, തെത്ത് ചോറ് തുടങ്ങിയ മുഖ്യവായ ആഹാരങ്ങൾ നൽകുക.
- കുടുംബവുടെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ സ.ആർ.എസ്. നൽകുക, കുട്ടി ശരിച്ചിച്ചാൽ 10 ശിനിട്ട് കാത്തിരിക്കുക, സാവധാനം തുടരുക.



സ്വീംഗാണിയ

- ശ്രീസകോൺഡേളേ ബാധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തല ശ്വാസകോഡ് രോഗാണുഭായയുടെ ഒരു രൂപമാണ് സ്വീംഗാണിയ.
- ലക്ഷണങ്ങൾ: ചുമ്മ, മുക്കൊലിപ്പ്, പനി, വേഗത്തിലുള്ള ശ്വാസോച്ചാസം, നെഞ്ച് അക്രോതക്കു വലിയുക.
- കുട്ടിയെ ചുടുകിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ സുക്ഷിക്കുക, ധാരാളം ദ്രാവകങ്ങൾ നൽകുക മുലയുടൻ തുടരുക.
- രോഗപ്രതിരോധം, പരുംപത്രമായ പോഷണം (വർദ്ധിപ്പിച്ച മുലയുട്ടലും പരുംപത്രമായ പരിപൂരക ദക്ഷണം നൽകലും) നല്കു രൂചിത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും മുവേനസ്വീംഗാണിയ തടയാൻ കഴിയും.
- എന്നെന്തെല്ലും അപകട ലക്ഷണം അബ്ലൈക്കിൽ വേഗത്തിലുള്ള ശ്വാസോച്ചാസം: ഉടൻ തന്ന ആശുപ്രതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക.



പനി

- പനിയുള്ള കുട്ടികൾ സാധാരണ ചുമ്മ, ഇലംഭാലം അബ്ലൈക്കിൽ വെറിൽ രോഗാണുഭായ ഉണ്ടായിരിക്കും.
- ഇളനിർ, നാരങ്ങാവെള്ളം, മോർ തുടങ്ങിയവ പോലെ ധാരാളം ദ്രാവകങ്ങൾ നൽകുക.
- കടുത്ത പനിയുള്ളപ്പോൾ തണ്ടുത്ത/നന്നത്ത തുണികൊണ്ട് നെറ്റിയിലും അവധിയണ്ണളിലും തുടയ്ക്കണം.
- ദക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അവധിയിലായാലുടനെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ കുട്ടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.
- കുട്ടികൾ 5 ദിവസത്തിലധികമായി പനിയുണ്ടാക്കിൽ, കുട്ടിയെ ഒരു ദോക്കണ്ണ അടുത്തേതുകൾ കൊണ്ടുപോകണം.

മലോറിയ

- കൊതുകു കടിക്കുന്നതു വഴിയാണ് മലോറിയ പരക്കുന്നത് അതിന് ഘാരകമായി മാറാൻ കഴിയും.
- രോഗികൾ കുളിരും വിറയലും, തലവേദന, ശരീര വേദന, ശരിച്ച എന്നിവയും പനിയുണ്ടായെങ്കാം.
- അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴേയുള്ള കുട്ടികൾ, തർജിണികൾ, മുൻപേതന്നെ രോഗികളായവർ എന്നിവയെരാണ് മലോറിയ കുടുതൽ തവണയും കുടുതൽ ഗുരുതരമായും ബാധിക്കുന്നത്.
- മലോറിയ തടയുന്നതിന് പ്രാണിനാശിനകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീടിനുള്ളിലെ റെസിഡിവവൽ സ്പ്രേയിംഗ് (എഫ്.ആർ.എസ്.) നടത്തുന്നതും പ്രാണിനാശിന പുരുട്ടിയ കിടക്ക വലകളും (എഫ്.ടി.എസ്.) ഫലപ്രദമാണ്.
- കൈകൾ മുഴുവനും മുട്ടുനു വസ്ത്രങ്ങൾ കുട്ടിയെ ധരിപ്പിക്കുന്നത് അഭികാശമാണ്.

