

# ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ର ବିପଦ ସଙ୍କେତ

## ଉପକ୍ରମ:

- ❖ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ବିନା ସମସ୍ୟାରେ ନିଜର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଅତିବାହିତ କରିଥାଆନ୍ତି । ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ସାଧାରଣ ବିକୃତ କରୁଥିବା ଘଟଣାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ଛାତିପୋତା, ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଖନରେ ମୃଦୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଫୁଲିବା ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ ହେବା ।



- ❖ ତେବେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ରେ ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଧରିବି ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମା ଶିଶୁ ବା ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଉଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ।
- ❖ ଯଦି ମହିଳା ମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯାଞ୍ଚ ସବୁ କରାଉଥିବେ । ତେବେ କେତେକ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନିତ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇ ପାରିଥାଏ ।
- ❖ ଏହି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପରେ, ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନବାଦି କର୍ମୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖି ପାରିବେ ।
- ❖ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଚାର ବା ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳିଲା, ତେବେ ମହିଳା ବା ଶିଶୁ ବା ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ଅସମତା ପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
- ❖ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଫିଲଡ଼୍ ରେଫରାଲ ଯୁନିଟ୍/ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯିବା ଦରକାର ।

## ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ବିପଦ ଆଗଙ୍କା କାରଣ



- ✚ ଗେଡ଼ା ବା କମ୍‌ଉଜଡା ବିଶିଷ୍ଟ ମହିଳା (145 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 4 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚରୁ କମ୍)
- ✚ ବୟସ 18 ରୁ କମ୍ ବା 35ରୁ ଅଧିକ ।
- ✚ ହୃଦରୋଗ, ଡାଇବେଟିସ୍, ଚିବି, ମେଲେରିଆ, ଆନିମିଆ ଏବଂ ସେହି ପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକାରର ଡାକ୍ତରୀ ସମସ୍ୟାର ଇତିହାସ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ।
- ✚ ପ୍ରଥମ ଡିଲିଭେରୀ ବେଳକୁ ଓଜନ 38 କି.ଗ୍ରା. ରୁ କମ୍ ରହିବା
- ✚ ପୂର୍ବଥର ଗର୍ଭ ବେଳେ ସମସ୍ୟା ଥିବା (ଖରାପ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମସ୍ୟା ବା ପୂର୍ବଥର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସମସ୍ୟା)
- ✚ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମେଲେରିଆ ହେବା ।
- ✚ ଗର୍ଭରେ ପିଲାଟ ବଳନ ମଞ୍ଜର/ମୋଟେ ନ ହେବା
- ✚ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକି:
  - ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଯେ କୌଣସି ମସୟରେ ରକ୍ତ ବାହାରିବା
  - ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯିବା
  - ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହାଇପରଟେନସନ୍ ଦେଖାଦେବା
  - ଅତି ସାଂଘାତିକ ଆନିମିଆ
  - ଯାଆଁଳା, ବା ଉପରେ ବଢ଼ିରହିଥିବା ଗର୍ଭାଗୟ



**ବିପଦ ସଙ୍କେତ:**

<p><b>ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ବା ପ୍ରସବ ସମୟରେ ରକ୍ତ ବାହାରିବା:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଅଥବା ପ୍ରସବ ସମୟରେ/ ପ୍ରସବ ପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଉଭୟ ମା' ଶିଶୁ ବା ମା' ପାଇଁ ମରଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ ।</li> <li>• ମହିଳାଙ୍କୁ ଏମିତି ଛିତିରେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା କୁ ନିଆଯିବା ଦରକାର ।</li> </ul>	
<p><b>ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟଧାରଣ ବା ନଥାଇ ରକ୍ତହୀନତା:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ଅତି ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଖିପତା, ନଖ ଓ ପାପୁଲି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇ ଦୁଃସ୍ୱପନ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ବା ନଥାଏ ।</li> <li>• ଏହା ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜଟିଳତାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି ପ୍ରସବ ସମୟରେ ହୃତପିଣ୍ଡ ବା ହାର୍ଟ କାମ ନକରିବା, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଏବଂ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ବେଳେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖା ଦେବା</li> <li>• ଅତି ସାଂଘାତିକ ରକ୍ତହୀନତାର ଶୀକାର ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରସବ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହିଁ କରାଯିବା ଦରକାର ।</li> </ul>	
<p><b>ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅଥବା ପ୍ରସବର ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋର୍ରେ ଜ୍ୱର ହେବା:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବା ଦରକାର ।</li> <li>• ଅଧିକ ଜ୍ୱାର ହେବା, ମହିଳାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଯେବଂରେ ବହୁଥିବା ଶିଶୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ ।</li> <li>• ମହିଳାକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ସମୟରେ ଭଲକରି ଘୋଡ଼େଇ ରଖି ଉଷୁମ ରଖିବା ଦରକାର</li> <li>• ଜ୍ୱରର ମାତ୍ରା କମ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଓଦା କନା ର ପଟି, ବା ପୋଛାପୋଛି ଟିକିଏ କରିଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ।</li> </ul>	
<p><b>କଂପ ଆସିବା ଫିଟ୍‌ସ ମାରିବା, ଆଖିକୁ ଝଙ୍କ ଦେଖା ନଯିବା, ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଫୁଲିଯିବା ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ମସ୍ତିଷ୍କ କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ ମା ଦେଖାଯିବା ତଥା ଜନ୍ମ ନହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇ ପାରେ ।</li> <li>• ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବା ଦରକାର ।</li> </ul>	
<p><b>12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟର ପ୍ରସବ ବେଦନା:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ମହିଳାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା କୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ।</li> <li>• ମହିଳା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସବ କରିବା ଉଚିତ୍ ।</li> </ul>	
<p><b>ବିନା ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଜଳମୁଣା ଫାଟିଯିବା:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ଯଦି ଜଳମୁଣା ଫାଟିଯାଏ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ ।</li> <li>• ମହିଳାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯିବା ଦରକାର ।</li> <li>• ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରସବ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାଇବା ଉଚିତ୍ ।</li> </ul>	