



କୁପୋଷଣ ନିରାକରଣ - ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

❖ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହା ଶିଶୁର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୁପୋଷଣ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବେ, ଯଦି ସେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନିମ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବେ ।

ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାନ ସମୟ	ମା' ଓ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ/ବାର୍ତ୍ତା
ଗର୍ଭଧାରଣ 4ର୍ଥ - 6ଶ ମାସ:	<ul style="list-style-type: none"> ଆଇରନ୍ ଫୋଲିକ ଏସିଡ୍ ଅନୁପୂରକ ତୋଳ ଗୁଡ଼ିକର ସେବନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ, ଆନେମିଆ ସ୍ଥିତିର ଆଧାରରେ ସମୁଦାୟ (100 ବା 200 ବର୍ଟିକା) । ଚିଟାନସ ଚକ୍ଳିତ୍ ନିଆ ହୋଇଥିବା କଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା, ଏମ୍.ସି.ପି. କାର୍ଡର ସତ୍ତ୍ୱ ନେବା । ଅଧିକ ଖାଇବା - ଭୋଜନର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ତଥା ବାରମ୍ବାରତା ବୃଦ୍ଧି, ଆୟୋଡିନ୍ ଲୁଣ ର ବ୍ୟବହାର । ଅଧିକ ବିଶ୍ରାମ କରିବା - ରାତିରେ 8 ଘଣ୍ଟା, ଦିନବେଳା 2 ଘଣ୍ଟା । ପ୍ରସବ ପାଇଁ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଷଣ ନେବା ଓ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରସବପୂର୍ବକ୍ତୀ ସତ୍ତ୍ୱ ନେବା ।
ଗର୍ଭଧାରଣ 7ମ - 9ମ ମାସ:	<p>ଉପରୋକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ନିମ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାନ୍ତୁ</p> <ul style="list-style-type: none"> ଆଇରନ୍ ଫୋଲିକ ଏସିଡ୍ ଅନୁପୂରକ ଏବଂ ଚିଟାନସ ଚକ୍ଳିତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇବା, ଯଦି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ । ଅତିକମ୍ରେ 3 ଥର ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ଯାତ୍ରା କରାଇବା (ଏନ୍.ଏଚ୍.ଡି. କାଳରେ) ରକ୍ତ ଚାପକୁ ମିଶାଇ । ଏକଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ଯେ, ପରିବାର, କୌଣସି ତାଙ୍କରଖାନା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସବ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନାବନ୍ଧ । (ସଂକ୍ଷା ଚିତ୍ରଟ, ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ, ଯାନ ବାହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ) । ଯଦି ଘରେ ଆକସ୍ମିକ ପ୍ରସବ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ (ଏସ୍.ବି.ଏ. ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଡି.ଡି.କେ./ରୁଟ, ସୂତା, ପରିଷ୍କାର ଲୁଗାପଟା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା) । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା (ଉପଯୁକ୍ତ ସଂକ୍ଷା ଚିହ୍ନଟ, ରକ୍ତ ଦାନକାରୀ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବା) । ନବଜାତ ଶିଶୁ ତୁରନ୍ତ ଜନ୍ମ ପରେ ତାର ସତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା । (ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଛନପାନ କରାଇବା, ତୁରନ୍ତ ତୃତୀୟ ସହ ତୃତୀୟ ଲଗାଇ ସତ୍ତ୍ୱ, ଗାଧୁଆରେ ବିଳମ୍ବ କରାଇବା, ନାଭି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିନିଷ କିଛି ବି ପ୍ରୟୋଗ ନକରିବା) । ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା : ମଝିରେ ବ୍ୟବଧାନ (ଆଇ.ୟୁ.ଡି.) ଅଥବା ସାମିତ ରଖିବା (ଟି.ଏଲ୍.) ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସବ ପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତଥା ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ (ଏନ୍.ଏସ୍.ଭି.) କରାଇନେବା । <p>ଯଦି ଜଣେ ଝିଅ ତା ମା' ପାଖକୁ ପ୍ରସବ କରାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, (ସାଧାରଣତଃ ୭ରୁ ୯ମାସ ବେଳକୁ) ତେବେ ଏକଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଓ ପରାମର୍ଶ ସବୁ ପାଇପାରିବେ; ତାସହ ସେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସାକରଣ କାର୍ଡ କୁ ଗାଁ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଇକି ଯିବେ; ଏଥିରେ ତାଙ୍କରଖାନାରେ ପ୍ରସବ କରାଇବା କଥା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ; ପରିଷ୍କାର ଘରରେ ପ୍ରସବ, ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସତ୍ତ୍ୱ (ନବଜାତ ଶିଶୁ ସତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ।</p>
ପ୍ରସବ ଦିନ:	<ul style="list-style-type: none"> ତୁରନ୍ତ ଏବଂ କେବଳ ଓ କେବଳ ଛନପାନ କରାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା/ସୁଚ୍ଛତା ଅନୁସରଣ କରି ସଂକ୍ରମଣର ମାତ୍ରା କମ୍ କରିବା (କେମ୍ ଧରାଧରି, ହାତଧୁଆ, ନାଭି କଟାର କ୍ରମାଗତ ସତ୍ତ୍ୱ) ବି.ସି.ଡି. ଏବଂ ଓ. ପି. ଭି. (0) ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଟିଳତା - ରକ୍ତସ୍ରାବ ଓ ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ହେଲେ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଶିଶୁଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା:- <ul style="list-style-type: none"> ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ତାରିଖ ର ପ୍ରାୟ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସବ ବା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଓଜନ 2 କି.ଗ୍ରା. ରୁ କମ୍ ଅଥବା ଜନ୍ମ ସମୟ ପରଠାରୁ ଖୁଆଇବାରେ ଦୁର୍ବଳ



ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ସମୟ	ମା' ଓ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ/ବାର୍ତ୍ତା
<p>ପ୍ରସବ ଦିନ:</p> <p>ଜନ୍ମ ପରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ (ଜନ୍ମ ଦିନଠାରୁ ଅତିକମ୍ରେ 1 ଥର ପରିଦର୍ଶନ, ସଦି ଏହା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ନବଜାତ ଶିଶୁ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଥର)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ଯଦି ପିଲାଟି ଦୁର୍ବଳ, ତେବେ ସଫା ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଉଷ୍ଣମ, ଛନପାନ ଓ ତୃତୀୟ ସହ ଲଗେଇ ଧରି ରଖିବା ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା । ନବଜାତ ଶିଶୁ ଠାରେ କୌଣସି ବେମାରର ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଓ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା (ଖାଇବାର ବେଗ ଓ ବାରମ୍ବାରତା କମିଯିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନ ଦିଶିବା) ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରେଫର୍ କରାଯିବ । କ୍ରମାଗତ ଛନପାନ, ଉଷ୍ଣମ ପ୍ରଦାନ ଓ ସୁଚ୍ଛତା ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ । ନବଜାତ ଶିଶୁ ଠାରେ କୌଣସି ବେମାରର ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଓ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା (ଖାଇବାର ବେଗ ଓ ବାରମ୍ବାରତା କମିଯିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନ ଦିଶିବା) ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରେଫର୍ କରାଯିବ । ମା' ହେବା ପରେ ପ୍ରସବ ଜନିତ କୌଣସି ଜଟିଳତା ଯେମିତିକି- ଜ୍ୱର ହେବା, ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ତାବ ହେବା, ସତେଜ ଭାବରେ ରକ୍ତ ସ୍ରାବ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା । ଦୁର୍ବଳ ନବଜାତଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟକ ହେବା: <ul style="list-style-type: none"> ବାରମ୍ବାର ପରିଦର୍ଶନ (ଦିନକୁ ଦୁଇଥର, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ରେ କରିନାହିଁ) ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଛନପାନ, ଉଷ୍ଣମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସହ ତୃତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା । ଦରକାର ପଡିଲେ ଛନରୁ ନିଜେ କ୍ଷୀର ବାହାରକରି ତାମତ ଦ୍ୱାରା ପିଲାକୁ ଦେବା ।
<p>ଜନ୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀ 8-30 ଦିନ ପରେ</p>	<ul style="list-style-type: none"> କ୍ରମାଗତ ଛନପାନ, ଉଷ୍ଣମ ଓ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ପରାମର୍ଶ । ନବଜାତଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ବେମାରର ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଓ ନିରାକରଣ (ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ) । ଛନପାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ ଓ ପରିଚାଳନା । ଚିକିତ୍ସାକରଣ । ଦୁର୍ବଳ ନବଜାତଙ୍କ ପରିଚାଳନା (ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ) । ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ରକ୍ଷାଉପରେ ପରାମର୍ଶ (ବିକଳ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏ.ଏନ୍.ଏମ୍. ପାଖକୁ ରେଫର୍ କରାଯିବ) ।
<p>1 ରୁ 5 ମାସ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ:</p>	<ul style="list-style-type: none"> 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଛନପାନ କରାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଚିକିତ୍ସାକରଣ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାସିକ ଓଜନ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ରକ୍ଷାଉପରେ ପରାମର୍ଶ (ବିକଳ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏ.ଏନ୍.ଏମ୍. ଙ୍କ ପାଖକୁ ରେଫର୍ କରାଯିବ) । ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରର ଉପାୟ ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ କରାନ୍ତୁ । ଛଅ ମାସ ପୂରଣ ପରେ ପରିପୁରକ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ।
<p>6 ରୁ 8 ମାସ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ଉପଯୁକ୍ତ ପରିପୁରକ ଖାଦ୍ୟ <ul style="list-style-type: none"> ଭାତ, ଖେରୁଡ଼ି ବା ରୁଟି ପରି ଅର୍ଦ୍ଧ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପରେ ଧିରେ ଧିରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା । ଅଲଗା ଏକ ଗିନାରେ ଖୁଆଇବା, ଅତିକମ୍ରେ 2-3 ଥର ଦିନକୁ । ସମୁଦାୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2 ଛୋଟ ଗିନା (200 ଗ୍ରାମ) ର ଏହିପରି ଅର୍ଦ୍ଧ କଠିନ୍ ଖାଦ୍ୟ । ଖାଦ୍ୟରେ ଚିକିଟ ତେଲ ବା ଘିଅ ମିଶାନ୍ତୁ । ଛନପାନ ସର୍ବଦା ଜାରୀ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷକରି ରାତିରେ । ଯତ୍ନ ସହ ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝି ଛନପାନ କରାଇବା; ପିଲାର ସଙ୍କେତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ; ପିଲାସହ ବସି ତାକୁ ଛନପାନ କରାନ୍ତୁ । ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ପରେ ତାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଛନପାନ କରାନ୍ତୁ । ନଅମାସ ବୟସ ବେଳକୁ ମିଳିମିଳା ଚିକା, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ମାସିକ ଓଜନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭୋଜନ । ସୁତନ୍ତ୍ର ସମର୍ଥନ ଦରକାର କରୁଥିବା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ (ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ, ଲିଙ୍ଗୀୟ ଭେଦଭାବ, ଅତି ଖରାପ ଛଙ୍ଗରେ ଯତ୍ନ ନେବା ଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯତ୍ନ ନେବା ବ୍ୟକ୍ତି) । ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ (ବିକଳ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ.ଏନ୍.ଏମ୍. ଙ୍କ ପାଖକୁ ରେଫର୍ କରାଯିବ) ।
<p>9 ରୁ 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ:</p>	<ul style="list-style-type: none"> 12 ମାସ ପରେ ପିଲାଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅନୁପୁରକ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ । ନିମ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜାରୀ ରଖନ୍ତୁ: <ul style="list-style-type: none"> ଯଥାର୍ଥ ପରିପୁରକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ (ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ 3-4 ଥରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଶିଶୁ ଦିନକୁ ଯେମିତି ଅତିକମ୍ରେ 3 ଛୋଟ ଗିନା ବା 300 ଗ୍ରାମ ଖାଇପାରିବ ଓ 18 ମାସ ବେଳକୁ ଦିନକୁ 500 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବା ଦରକାର) । ବେମାର ପରେ ଖୁଆଇବା ମାତ୍ରା ବଢ଼ାନ୍ତୁ । ସମୟାନୁସାରେ ଚିକାକରଣ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଓ ମିଳିମିଳା ଚିକା ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରତିମାସ ଓଜନ କରାନ୍ତୁ । ସୁତନ୍ତ୍ର ସମର୍ଥନ ଓ ସହାୟତା ଦରକାର କରୁଥିବା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ (ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ, ଲିଙ୍ଗୀୟ ଭେଦଭାବ, ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଯତ୍ନ ନେବା ଶୈଳୀ) ।