



# ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ

## ਆਇਓਡੀਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਆਇਓਡੀਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਹਾਰ ਆਇਓਡੀਨ ਲਈ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ. ਆਰ. 2010 ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

ਸ੍ਰੋਟੀ/ਉਮਰ	ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਏ.		
	(mcg/Kg/d)	(mcg/d)	ਉਪਰੀ ਸੀਮਾ (mcg/Kg/d)
ਸਿਸ੍ਟ੍ਰੂ (0-6 ਮਹੀਨੇ)			ਮਾਂ ਦਾ ਢੁੱਧ
7-12 ਮਹੀਨੇ	6-30	90	140
ਛੇਟੇ ਥੱਚੇ (1+ਤੋਂ 5 ਸਾਲ)		90	50
ਸਾਰੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਥੱਚੇ	4	120	50
ਕਿਸੌਰ ਅਤੇ ਵਿਆਸਕ (>13 ਸਾਲ)	2	150	30
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ	4.5	250	40
ਢੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ	4.5	250	40

## ਭਰੂਨ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਗਰਭਪਾਤ ਜਨਮ ਰੁਕਣਾ, ਮ੍ਰਿਤ ਜਨਮ, ਅਨੁਵਾਂਸਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸਵ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਰ ਵਧਣਾ, ਸਿਸ੍ਟ੍ਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਣਾ, ਤੰਤਰਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਰੀਆਂ (ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬਹਿਰਾਪਣ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ, ਅਪਰੰਗ ਅਤੇ ਸਕਵਿੰਦ) ਬੋਲਾਪਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਰੂਪਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇਕੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ।

## ਨਵਜਾਤ ਸਿਸ੍ਟ੍ਰੂ ਅਤੇ ਕਿਸੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਨਵਜਾਤ ਸਿਸ੍ਟ੍ਰੂ ਰੰਢ ਅਤੇ ਹਾਇਪੋਬਾਇਰੋਇਡਜ਼ਮ ਗਲ-ਰੰਢ, ਨਵਜਾਤ ਸਿਸ੍ਟ੍ਰੂ ਵਿੱਚ ਹਾਇਪੋਬਾਇਰੋਇਡਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਣਾ।

## ਵਿਆਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਗਲਰੰਢ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ, ਰੰਢਦਾਰ ਥਾਈਓਰੋਇਡ, ਹਾਇਪੋਬਾਇਰੋਇਡਜ਼ਮ।

## ਗਲਰੰਢ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ

ਸੂਚਕ	ਹਲਕਾ	ਮੱਧਮ	ਗੰਭੀਰ
ਗਲਰੰਢ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ > 0	5-19.9%	20-29.9%	≥30%
ਮੱਧਮ (ਮਾਰਿਫ਼ੋਗ੍ਰਾਮ)	50-99	20-49	<20

## ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਕਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

• • •

- ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ।
- ਆਮ ਨਮਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਓਡੀਨ ਨਮਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ।
- ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨਯੁਕਤ ਨਮਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਰਵੇਖਣ।
- ਆਇਓਡੀਨ ਯੁਕਤ ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਲੈਬੋਰੋਟਰੀ ਪਰੀਖਣ।
- ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਸ਼ੁਹੂਰੀ।

## ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?



- ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਇਓਡੀਨਯੁਕਤ ਨਮਕ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿੱਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਗਲਰੀਛ ਜਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਸੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਰੀਛ ਵਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਪਾਚਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦਗੋਭੀ, ਫੁੱਲਗੋਭੀ, ਭਿੰਡੀ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਆਜੂ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਬਦਾਮ, ਸਰੋਂ, ਸੋਰਘਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਆਇਓਡੀਨ ਇਕ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਗਾਨ, ਨੁਕੜ ਨਾਟਕ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਆਇਓਡੀਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀਡਿਓ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕਈ ਪੈਸਟਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਇਓਡੀਨਯੁਕਤ ਨਮਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਸਕਣ।
- ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


### ਗਲਰੀਛ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ



**ਗ੍ਰੇਡ 0** - ਕੋਈ ਛੂਹਣਯੋਗ ਜਾਂ ਦਿਖਣਯੋਗ ਗਲਰੀਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ



**ਗ੍ਰੇਡ 1** - ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਜੋ ਗਰਦਨ ਵੱਲ ਉਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਛੂਹਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗਰਦਨ ਦੀ ਆਮ ਸਬਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ।



**ਗ੍ਰੇਡ 2** - ਗਰਦਨ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਥਾਇਓਇਡ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੂਹਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।