

# గర్భవతిగా ఉన్న సమయంలో ప్రమాదకర చిహ్నాలు

## పరిచయం

- ❖ ఎటువంటి ప్రమాదకరమైన సమస్యలు లేకుండానే చాలామంది మహిళలు గర్భిణి దశని దాటుతారు. గర్భవతిగా ఉన్న సమయంలో గుండెలో మంట, వీపు నొప్పి, రొమ్ముల్లో నొప్పి, వాపు మరియు అలసటలు సాధారణంగా ఉంటాయి.



- ❖ అయితే, గర్భిణిగా ఉన్న సమయంలో మరియు ప్రసవించే సమయంలో కొన్ని సమస్యలు కలగవచ్చు. ఇవి తల్లిని, బిడ్డని లేదా ఇరువురికి ప్రాణాంతకం కావచ్చు.
- ❖ ప్రసవించటానికి ముందు తరచుగా పరీక్షలు చేయించుకుంటే కొన్ని సమస్యలతో ఉన్న మహిళల్ని ఆరంభంలోనే గుర్తించవచ్చు.
- ❖ ఈ ప్రమాదకరమైన చిహ్నాల్ని తెలుసుకోవటం వల్ల ఒక గర్భిణి స్త్రీకి ఎప్పుడు వైద్య సహాయక సిబ్బంది నుంచి ప్రత్యేకమైన సహాయం అవసరమో అంగన్ వాడీ కార్యకర్త తెలుసుకోవటంలో సహాయపడుతుంది.
- ❖ సరైన సమయానికి చికిత్స తీసుకోకపోతే, మహిళ లేదా బిడ్డ లేదా ఇరువురు మరణించవచ్చు లేదా అంగవైకల్యానికి దారి తీయవచ్చు.
- ❖ ప్రమాదకరమైన చిహ్నాలు కలిగిన గర్భిణి స్త్రీని సలహా కోసం ఎమ్.ఆర్.యు / ఆసుపత్రికి తరలించాలి.

## గర్భవతిగా ఉన్న సమయంలో ప్రమాదకరమైన అంశాలు



- ✚ పొట్టిగా ఉండే మహిళలు (145 సెం.మీ కంటే లేదా 4 అడుగుల 10 అంగుళాల కంటే తక్కువ పొడవు ఉన్న వారు).
- ✚ 18 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ లేదా 35 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉండటం.
- ✚ గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, టి.బి, మలేరియా, రక్తహీనత మరియు వేరే ఇతర వైద్య సమస్యల వంటి ఏదైనా చరిత్ర.
- ✚ మొదటి మూడు నెలల్లో బరువు 38 కేజీల కంటే తక్కువగా ఉండటం.
- ✚ గతంలో గర్భవతిగా ఉన్న సమయంలో కలిగిన సమస్యలు (చెడు ప్రసూతి చరిత్ర లేదా గతంలో సిజేరియన్ ఆపరేషన్ జరిగి ఉండటం).
- ✚ గర్భవతిగా ఉన్న సమయంలో మలేరియా కలగటం.
- ✚ పిండం కదలిక లేకపోవటం/మందకొడిగా ఉండటం.
- ✚ ప్రస్తుతం గర్భవతిగా ఉన్న సమయంలో ఈ కింది సమస్యలు వంటివి:
  - గర్భవతిగా ఉన్న ఏ సమయంలోనైనా రక్తస్రావం కలగటం.
  - అసాధారణంగా బిడ్డ కనిపించటం.
  - గర్భం వల్ల రక్తపోటు పెరగటం.
  - తీవ్రమైన రక్తహీనత.
  - కవలలు, గర్భస్థంపై పెద్దది కావటం.



## ప్రమాదకర చిహ్నాలు:

<p><b>గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు లేదా ప్రసవించిన తర్వాత రక్షణాప్రాపం:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• గర్భవతిగా ఉన్న సమయంలో రక్షణాప్రాపం కలగటం లేదా ప్రసవించే సమయంలో / తర్వాత ఎక్కువగా రక్షణాప్రాపం కలగటం తల్లి మరియు / లేదా బిడ్డకి ప్రాణాంతకం కావచ్చు.</li> <li>• మహిళని వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లాలి.</li> </ul>	
<p><b>ఊపిరి ఆడకపోవటం లేకుండా లేక దానితో పాటు తీవ్రమైన రక్తహీనత:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• తీవ్రమైన రక్తహీనత కలిగిన మహిళలకు కళ్ళు, గోళ్ళు మరియు అరచేతులు పాలిపోయి ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఊపిరి ఆడకపోవటం ఉంటుంది లేదా ఉండకపోవచ్చు.</li> <li>• ఇది ప్రసవించే సమయంలో గుండె ఆగిపోవటం, ముందస్తుగా నొప్పులు కలగటం మరియు గర్భిణిగా ఉన్న సమయంలో అంటువ్యాధులు కలగటం వంటి ఇతర ఎన్నో సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.</li> <li>• తీవ్రమైన రక్తహీనత కలిగిన గర్భిణి స్త్రీ తప్పనిసరిగా ఆసుపత్రిలో ప్రసవించాలి.</li> </ul>	
<p><b>గర్భవతిగా ఉన్న సమయంలో లేదా ప్రసవించిన వెల రోజుల లోపల తీవ్రమైన జ్వరం:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ఈ పరిస్థితిలో, ఆమెని వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లాలి.</li> <li>• తీవ్రమైన జ్వరం అనేది మహిళల్లో ఏదో ఒక ఇన్ ఫెక్షన్ ని సూచిస్తుంది. ఇది ఎదుగుతున్న శిశువుకి హానికరం.</li> <li>• మహిళని రవాణా చేసే సమయంలో ఆమెకి ఒంటి నిండా దుప్పట్లు కప్పి వెచ్చగా ఉంచాలి.</li> <li>• జ్వర తీవ్రతని తగ్గించటానికి తడి, కోల్డ్ స్పాంజింగ్ లని ఉపయోగించవచ్చు.</li> </ul>	
<p><b>మూర్చలు, కంటిచూపు మనకబారటం, తలనొప్పి, ఆకస్మికంగా పాదాలు వాచటం:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ఈ పరిస్థితి మెదడుకి హాని కలిగించవచ్చు/తల్లి మరియు జన్మించని శిశువు మరణించవచ్చు.</li> <li>• ఈ పరిస్థితిలో కూడా, సాధ్యమైనంత త్వరగా ఆమెని ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లాలి.</li> </ul>	
<p><b>12 గంటల కంటే ఎక్కువగా ప్రసవ నొప్పులు:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• మహిళని వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లాలి.</li> <li>• మహిళకి డాక్టర్ సమక్షంలో ప్రసవం జరగాలి.</li> </ul>	
<p><b>ప్రసవ నొప్పులు లేకుండా నీటి సంచి పగిలిపోవటం:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• నీటి సంచి పగిలిపోతే మహిళకు మరియు శిశువుకి ఇన్ ఫెక్షన్ కలిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.</li> <li>• మహిళని వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లాలి.</li> <li>• మహిళకి డాక్టర్ సమక్షంలో ప్రసవం జరగాలి.</li> </ul>	