



అయోడిన్ లోపం వ్యాధి

అయోడిన్ ఎందుకు అవసరం?

అయోడిన్ అనేది ఒక ప్రధానమైన సూక్ష్మ పోషకం. ఇది మానవ శరీరంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పనులకి మధ్యతునిస్తుంది. అయోడిన్ కోసం 2010 ఐ.సి.ఎం.ఆర్. ప్రకారం సిఫారసు చేయబడిన ఆహారపు అనుమతులు.

తరగతి/పయసు	అయోడిన్ అర్థాత్		
	(mcg/Kg/d)	(mcg/d)	ప్రైప్టాయి పరిమితి (mcg/Kg/d)
శిశువులు (0-6 వెలలు)	6-30	తల్లిపాలు	తల్లిపాలు
7-12 వెలలు		90	140
చిస్టు పిల్లలు (1 సంవిషిత సంవత్సరాలు)		90	50
పారశాలలకు వెళ్లే పిల్లలు	4	120	50
యుక్తపయిస్తులు మరియు పెద్దలు (13 సంవత్సరాలు)	2	150	30
గర్భాశ్మిలు	4.5	250	40
పాలిచ్చే తల్లలు	4.5	250	40

పీందంలో అయోడిన్ లోపం లక్షణాలు

గర్భాశ్మిలు, శిశువు మరణించి పుట్టటం, పుట్టుకతో సంక్రమించిన లోపాలు, ప్రసవానికి ముందు తర్వాత కాలానికి సంబంధించి పెరిగిన మరණాలు, పెరిగిన శిశు మరණాలు, స్వీరోలాజికల్ క్రెటినిజం (మానసిక లోపం, చెప్పుడు, స్వాస్థీక డిఫ్లేజియూ మరియు మెల్లకస్తులు), పొట్టి, మానసిక లోపాలు మరియు సైకోమోటర్ లోపాలు.

కొత్తగా పుట్టిన శిశువులు, వసి పిల్లలు మరియు యుక్తపయిస్తుల్లో అయోడిన్ లోపం లక్షణాలు.

నియోనాటల్ గోయిటర్ మరియు ప్రైప్టాఫ్రోయిడిజమ్, గోయిట్రి, నియోనాటల్ ప్రైప్టాఫ్రోయిడిజమ్, లోపంతో కూడిన మానసిక పరిస్థితి, శారీరక అభివృద్ధి లేకపోవటం.

పెద్దల్లో అయోడిన్ లోపం లక్షణాలు

శక్తి లేకపోవటం, గోయిటర్ మరియు యాంత్రిక సమస్యలు, నోడ్యూలార్ డైరాయిడ్, ప్రైపర్ట్రోయిడిజమ్.

గోయిటర్ తీవ్రత

మూలిక	స్వల్పంగా	మధ్యస్థంగా	తీవ్రంగా
గోయిటర్ గేస్	5 -19.9%	20-29.9%	>_ 30%
> 0			
మధ్యస్థంగా (మైక్రోగ్రామ్/1)	50-99	20-49	<20

**జాతీయ అయోడిన్
లోపం వ్యాధుల
నియంత్రణ కార్బ్రూక్రమం
లక్కాగ్లు**

• • •

- అయోడిన్ డిఫిషియెన్సి డిజార్డర్స్ (ఐ.డి.డి.) తీవ్రతని అంచనా వేయటానికి సర్వేలు.
- సాధారణ ఉప్పు స్థానంలో అయోడిట్ ఉప్పు సరఫరా.
- అయోడిన్ డిఫిషియెన్సి డిజార్డర్స్ తీవ్రతని మరియు అయోడిట్ ఉప్పు ప్రభావాన్ని అంచనా వేయటానికి ప్రతీ 5 సంవత్సరాలకు తెరిగి సర్వే చేయాలి.
- అయోడిట్ ఉప్పు ప్రయోగశాల పర్యవేక్షణ మరియు మూత్రం ద్వారా అయోడిన్ విసర్జన.
- ఆరోగ్య చైతన్యం మరియు ప్రచారం.



అవగాహనను పెంచుటకు అంగన్వాడి కార్యక్రము ఏమి చేయవలెను

- ఒక కమ్యూనీటీలో పిల్లలు మరియు తల్లుల వివిధ అవసరాలు పరస్పర సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. అయ్యాడైజ్ ఉపస్థితిలో గురించి చైతన్యాన్ని అందించటానికి అంగన్వాడిని ఒక ప్రాథమిక కేంద్రంగా ఉపయోగించవచ్చు.
- ఔరాయిడ్ వ్యాధి లేదా అయ్యాడిన్ లోపం ఉన్నట్లుగా గుర్తించినట్లుతో, గోయిట్రోజెన్స్ వాడకాన్ని తక్కువ చేయాల్సిందిగా అంగన్వాడి కార్యక్రము కుటుంబానికి కొన్నిలింగ్ చేయాలి. ఎందుకంటే అని అయ్యాడిన్ మెటుబాలిజంతో జోక్కుం చేసుకుంటాయి. క్యూబేజీ, క్యూలీఫ్లవర్, బెండ్, పీచెన్, సోయాబీన్, బాదంపప్పులు, అవాలు, సోర్ఫుమ్స్ మొదలైనవి వినియోగించరాదు.
- జానపద గీతాలు, నాటకాలు, ఒక్కుక్కరికి కొన్నిలింగ్ చేయటం మొదలైనవి భాగంగా చేసి అంగన్వాడి కార్యక్రము ప్రజా చైతన్య కార్యక్రమాన్ని తయారు చేయవచ్చు.
- ఐ.డి.డి. మరియు దాని నివారణ గురించి అంగన్వాడి కార్యక్రమ వీటియొని కమ్యూనీటీకి చూపించాలి.
- వివిధ పోష్టర్లు తయారు చేసి కనబరచాలి. అందువల్ల ప్రజలు అయ్యాడైజ్ ఉపస్థితిలో ప్రాధాన్యత గురించి తెలుసుకుంటారు.
- అంగన్వాడి కేంద్రం అయ్యాడిన్ పెస్టింగ్ కిట్ని కలిగి ఉండాలి. ఇది ఉపస్థితిలో అయ్యాడిన్ ఎంత ఉండో పరీక్షించటానికి ఉపయోగించబడాలి.

గోయిటర్ వర్గీకరణ



గోయిటర్ వర్గీకరణ



గ్రేడ్ 0 - స్పృష్టంగా
లేక కనిపించే
గోయిటర్ లేదు



గ్రేడ్ 1- మెడలో మాంసగడ్డ
మెడ పై బాగం వైపు
కదులుతుంది. అది స్పృష్టంగా
ఉంటుంది కానీ మెడ సాధారణ
భంగిమలో ఉన్నప్పుడు
కనిపించదు.

గ్రేడ్ 2 - మెడలో పైకి కనిపించే
వాపు, ఔరాయిడ్ గ్రంథి పెద్దది
కావటం మరియు స్పృష్టంగా
కనిపించటం.