

حمل کے دوران خطرات کی نشانیاں

تعارف

- عام طور پر دوران حمل عورتوں کو تکلیفیں درپیش نہیں ہوتیں تاہم دوران حمل ہونے والی تکلیفوں میں سینے میں جلن، پیٹھ کا درد چھاتی کا ورم اور نرم اور تھکن شامل ہیں۔



- تاہم حمل کے دوران اور بچے کی پیدائش کے وقت کچھ تکلیفیں ہو سکتی ہیں جن سے زچہ پچہ کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔
- یہ بھی ممکن ہے کہ زچگی سے قبل کی جانچ کے دوران کافی جلدی عورت کی بیماری کی پہچان کر لی جائے۔
- ان خطروں کی معلومات آنگن و اڑی و رکرو یہ اندازہ لگانے میں معاون ہوتی ہے کہ کب کسی حاملہ عورت کو علاج و معالجے میں خصوصی ضرورت درپیش ہو سکتی ہے۔
- اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ حاملہ عورت کی موت یا بچے کی معذوریت یا زچہ بچہ دونوں کے لئے سنگین خطرے پیدا ہو سکتے ہیں۔
- اگر کسی حاملہ عورت میں خطرے کی علامتیں پائی جائیں تو اسے مشورے کے لئے فلیڈ ریفل یونٹ/ اسپتال لے جایا جانا چاہے۔

حمل کے دوران خطرے کے عناصر

•••

- چھوٹے قد کی عورت (145 سینٹی میٹر یا 4 فٹ 11 انچ سے کم)
- عمر اگر 18 سے کم اور 35 سال سے زیادہ ہو۔
- اگر عورت دل کے مرض، ذیابطس، ٹی بی، ملیریا، انیسیا اور دیگر کسی قسم کی مریضہ رہی ہو۔
- پہلی سہ ماہی میں عورت کا وزن 38 کلو گرام سے کم ہو۔
- سابقہ زچگی میں دشواری (زچگی کے وقت دشواری یا زچگی آپریشن)۔
- اگر دوران حمل ملیریا ہوا ہو۔
- دوران حمل بچے کی حرکت میں کمی یا استقامتہ حمل کے دوران درج ذیل کوئی شکایت ہو:
- حمل کے دوران کسی بھی وقت خون آنا
- غیر معمولی صورتحال
- حمل سے پیدا ہونے والی ہائپر ٹینڈشن
- شدید انیسیا (خون کی کمی)
- جریاں بچوں کی وجہ سے بچہ دانی میں غیر معمولی پھیلاو

خطریے کی علامتیں:

| | |
|---|--|
| <p>حمل کے دوران یا زچگی کے وقت خون آنا۔</p> <ul style="list-style-type: none"> دوران حمل یا زچگی کے وقت یا اس کے بعد زیادہ خون بہنا، زچم پر دنوں کے لئے مہلک ہو سکتا ہے۔ عورت کو فوری طور پر اسپتال لے جایا جانا چاہے۔ | |
| <p>سانس کی شکایت یا اس کے بغیر شدید انسیما۔</p> <ul style="list-style-type: none"> شدید انیمیا سے متاثرہ عورت کی پلکیں، ناخن اور تھیلیوں کا پیلی پڑ جانا، ان کو سانس کی شکایت ہو سکتی اور نہیں بھی۔ اس سے بہت سی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں مثلاً زچگی کے وقت دل کا بند ہو جانا، حمل کے دوران انفیکشن اور بچے کی بیدارش مقررہ وقت سے پہلے ہو جانا۔ شدید انیمیا سے متاثرہ عورت کی زچگی اسپتال میں ہی کرائی جانی چاہئے۔ | |
| <p>دوران حمل یا زچگی سے ایک ماہ قبل بخار کی شدت۔</p> <ul style="list-style-type: none"> اس صورت میں حاملہ عورت کو فوری طور پر اسپتال لے جایا جانا چاہئے۔ شدید بخار ہونا اس بات کی علامت ہے کہ عورت کسی قسم کے انفیکشن سے متاثر ہے، جو بچے کی افزائش کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایسی عورت کو لانے لے جانے کے دوران پوری طرح گرم کپڑوں سے ڈھک کر لے جانا چاہئے۔ بخار کرم کرنے کے لئے گلی اور خندی پیپلوں کا استعمال کریں۔ | |
| <p>تشنج یا دوریے پڑنا، دھنڈلا نظر آنا، سر درد اور پیروں پر اچانک ورم آجائنا۔</p> <ul style="list-style-type: none"> ایسی صورت حال میں دماغ کے لئے نقصانہ اور زیادہ حمل بچے کی موت کا سبب ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں حاملہ عورت کو فوری طور پر اسپتال لے جایا جانا چاہئے۔ | |
| <p>زچگی کا درد 12 گھنٹے سے زیادہ ہونا</p> <ul style="list-style-type: none"> عورت کو فوری طور پر اسپتال لے جایا جانا چاہئے۔ اس کی زچگی ڈاکٹر کی موجودگی میں کرائی جانی چاہئے۔ | |
| <p>زچگی کے درد کے بغیر پانی کی تمیلی کا پہٹ جانا:</p> <ul style="list-style-type: none"> پانی کی تھیلی پھٹ جانے کی صورت حال میں زچم پر کوشیدا انفیکشن لا جت ہو سکتا ہے۔ عورت کو فوری طور پر اسپتال لے جایا جانا چاہئے۔ اس کی زچگی ڈاکٹر کی موجودگی میں کرائی جانی چاہئے۔ | |