

نابالغ بچوں کی افزائش نسل سے متعلق جنسی صحت

سن بلوغت سے پہلے دور میں جسمانی تبدیلیاں

❖ سن بلوغت سے پہلے کا دور 10 سے 19 سال کے دوران ہوتا ہے۔ اس دوران بچوں کے بدن میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں ہوتی ہیں:



بچہ

- لمبے ہو جاتے ہیں
- بغلوں میں اور ناگ کے نیچے، سینے اور ٹانگوں پر بال آنے لگتے ہیں، یہکی ہلکی داڑھی اور موچھ کے بال بھی آجاتے ہیں
- پسینے اور تیل کے غدوں کام کرنے لگتے ہیں اور چہرے پر مہا سے نکلنے لگتے ہیں
- پچھے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں
- آواز بھاری اور سخت ہو جاتی ہے




بچہ

- لمبی اور بڑی ہو جاتی ہیں
- کوٹھے بھاری ہو جاتے ہیں
- چھاتیاں نظر آنے لگتی ہیں
- بغلوں میں اور ناف کے نیچے بال آنے لگتے ہیں
- پسینے اور تیل کے غدوں کام کرنے لگتے ہیں اور چہرے پر مہا سے نکلنے لگتے ہیں

افزاں نسل سے متعلق صحت کے معاملات

- ❖ جسم کے دوسرے حصوں کی طرح ہمارے جسم کے پوشیدہ اعضاء اور غدد کی صحت بھی اہم ہوتی ہے کیونکہ حیض وغیرہ بچے کی پیدائش کے لئے اہم ہے۔
- ❖ ہمیں جسم کے ان حصوں کو کسی بھی قسم کے نفیکشن سے بچانے کے لئے مناسب صفائی سترائی کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ❖ نسل بڑھانے کے لئے مخصوص اعضاء میں صفائی سترائی نہ ہونے (ری-پروڈکٹیوٹریکٹ نفیکشن، RTI) یا نفیکشن سے متاثرہ ساقی (STI) کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے نفیکشن ہو سکتا ہے۔
- ❖ افزائش نسل سے تعلق رکھنے والے اعضاء میں ہونے والے نفیکشن کا فوری طور پر ڈاکٹر سے علاج کرنا چاہئے۔

تولیدی اعضاء میں انفیکشن کی علامتیں



خاندان کی منصوبہ بندی اور محفوظ طرح سے ماں بننا۔

- ❖ کم عمر میں شادی کرنے سے بچیں۔
- ❖ کم عمر یا منصوبے کے بغیر حمل سے بچیں
- ❖ چھوٹے اور منصوبہ بند خاندان کے لئے مانع حمل جیسے کنڈوم، مانع حمل گولیاں، (IUCD/IUD/Copper-T) وغیرہ استعمال کریں۔
- ❖ RTI/STI کی علامتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔
- ❖ HIV/AIDS کی علامتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔
- ❖ کسی کو HIV مندرجہ ذیل طریقوں سے ہو سکتا ہے۔
 - متاثرہ شخص کے ساتھ غیر محفوظ جنسی تعلق قائم کرنے سے
 - غیر محفوظ / انفیکشن سے متاثرہ خون چڑھانے سے
 - متاثرہ ماں سے بچے کو، اس کی پیدائش، حمل یا دودھ پلانے سے۔
 - انفیکشن سے متاثرہ انجکشن وغیرہ لگانے سے۔

تولیدی اعضاء میں انفیکشن کی روک تھام اور علاج کیسے کریں

- ❖ لڑکیوں کو ماہواری کے دوران صفائی سترہائی رکھنی چاہئے۔
- ❖ اگر میاں بیوی میں کسی ایک کو بھی STI ہو تو جنسی تعلقات سے گریز کریں۔
- ❖ محفوظ جنسی تعلق قائم کریں، کنڈوم کا استعمال کریں۔
- ❖ جنسی تعلقات میں ذمہ داری نہ کیں اور ایک ہی ساتھی کے ساتھ وفادار رہیں۔
- ❖ زچگی کے لئے اسپتال کو ترجیح دیں۔
- ❖ غیر معمولی یا اچانک انزال کو نظر انداز نہ کریں۔
- ❖ صرف اسپتال میں ہی محفوظ طریقے سے اسقاط کرائیں
- ❖ اپنا اور اپنے ساتھی کا کسی بھی جنسی پریشانی کے لئے ڈاکٹر سے علاج کرائیں۔